




































Insektenfreundliche Pflanzen

für einen sonnigen Standort

	 Name	Lebensdauer	Standort	Boden	Blütezeit	Wuchshöhe /-fläche (cm)	Zu beachten	Besondere Liebhaber 
	Acker-Kratzdistel <i>Cirsium arvense</i>	mehrhjährig	 		Juli – Okt.	30 - 150 / 100 - 150		Distelbohrfliege
	Acker-Schöterich <i>Erysimum cheiranthoides</i>	einjährig	 		April – Aug.	15 - 60 / 20 - 40		Schöterich-Mauerbiene
	Arznei-Thymian <i>Thymus pulegioides</i>	mehrhjährig	 		Juni – Okt.	8 - 15 / 5 - 10		Quendel-Bläuling
	Berg-Lauch <i>Allium lusitanicum</i>	mehrhjährig	 		Juli – Aug.	20 - 45 / 5 - 10		Lauch-Maskenbiene
	Blutroter Storchschnabel <i>Geranium sanguineum</i>	mehrhjährig	 		Mai – Sept.	20 - 30 / 30 - 50		Storchschnabel-Bläuling
	Dornige Hauhechel <i>Ononis spinosa</i>	mehrhjährig	 		Juni – Aug.	10 - 60 / 15 - 30		
	Echter Arznei-Baldrian <i>Stellaria holostea</i>	mehrhjährig	 		Mai – Juli	100 - 170 / 20 - 25		Baldrian-Schneckenfalter
	Echtes Lungenkraut <i>Pulmonaria officinalis</i>	mehrhjährig	 		März – Mai	15 - 30 / 15 - 30		



Legende:




schattig




halbschattig



sonnig




nährstoffarm




nährstoffreich



kalkhaltig



lehmig



sandig



basisch



sauer



ganz oder in Teilen giftig









































nicht berühren



Insektenfreundliche Pflanzen

für einen sonnigen Standort

	 Name	Lebensdauer	Standort	Boden	Blütezeit	Wuchshöhe /-fläche (cm)	Zu beachten	Besondere Liebhaber 
<small>Jörg Hempel / CC BY-SA 3.0 DE</small> 	Echter Salbei <i>Salvia officinalis</i>	mehrwährig	 		Mai – Juli	30 - 50 / 30 - 50		
<small>Andreas Rordstein / CC BY-SA 2.0</small> 	Feld-Mannstreu <i>Eryngium campestre</i>	mehrwährig	 	 	Juli – Sept.	15 - 60 / 40 - 60		Mannstreu-Seidenbiene
<small>Anneke Eitner / CC BY-SA 4.0</small> 	Gamander-Ehrenpreis <i>Veronica chamaedrys</i>	mehrwährig	 	 	April – Juni	10 - 30 / 20 - 25		Ehrenpreis-Sandbiene
<small>Udo Schimidt / CC BY-SA 2.0</small> 	Gelbe Resede <i>Reseda lutea</i>	mehrwährig	 	 	Juni – Sept.	30 - 70 / 40 - 50		Reseden-Maskenbiene
<small>Anneke Eitner / CC BY-SA 2.5</small> 	Gewöhnliche Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i>	mehrwährig	 		Juli – Okt.	40 - 60 / 40 - 50		Schafgarben-Blütenspanner
<small>Christian Fischer / CC BY-SA 3.0</small> 	Gewöhnliche Wegwarte <i>Cichorium intybus</i>	mehrwährig	 		Juli – Okt.	60 - 120 / 50 - 60		Wegwarten-Hosenbiene
<small>Alexandra / CC BY-SA 3.0</small> 	Gewöhnlicher Beifuß <i>Artemisia vulgaris</i>	mehrwährig	 		Juli – Sept.	70 - 120 / 60 - 80		Beifuß-Mönch, Gefleckter Langgrüssler
<small>Burkhard Mücke / CC BY-SA 4.0</small> 	Gewöhnlicher Dost <i>Origanum vulgare</i>	mehrwährig	 		Juli – Sept.	30 - 50 / 30 - 40		




Legende:




schattig

halbschattig

sonnig




nährstoffarm




nährstoffreich



kalkhaltig



lehmig



sandig



basisch



sauer



ganz oder in Teilen giftig






























nicht berühren



Insektenfreundliche Pflanzen

für einen sonnigen Standort

	 Name	Lebensdauer	Standort	Boden	Blütezeit	Wuchshöhe /-fläche (cm)	Zu beachten	Besondere Liebhaber 
	Gewöhnlicher Gilbweiderich <i>Lysimachia vulgaris</i>	mehrhjährig			Juni – Aug.	50 - 150 / 40 - 50		Wald-Schenkelbiene
	Gewöhnlicher Natternkopf <i>Echium vulgare</i>	zweijährig			Mai – Aug.	25 - 100 / 30 - 40		Glänzende Natternkopf-Mauerbiene
	Gewöhnliches Hirtentäschel <i>Capsella bursa-pastoris</i>	ein- bis zweijährig			Feb. – Okt.	5 - 60 / 10 - 30		
	Großblütige Königskerze <i>Verbascum densiflorum</i>	zweijährig			Juni – Aug.	50 - 120 / 15 - 45		Königskerzen-Mönch
	Große Fetthenne <i>Hylotelephium telephium</i>	mehrhjährig			Juli – Sept.	25 - 50 / 10 - 25		
	Kartäusernelke <i>Dianthus carthusianorum</i>	mehrhjährig			April – Sept.	15 - 45 / 30 - 40		
	Kleine Braunelle <i>Prunella vulgaris</i>	mehrhjährig			Juni – Sept.	5 - 25 / 10 - 40		
	Kriechender Günsel <i>Ajuga reptans</i>	mehrhjährig			April – Juni	15 - 30 / 20 - 25		




schattig




halbschattig



sonnig




nährstoffarm




nährstoffreich



kalkhaltig



lehmig



sandig



basisch



sauer



ganz oder in Teilen giftig



































nicht berühren



Insektenfreundliche Pflanzen

für einen sonnigen Standort

	 Name	Lebensdauer	Standort	Boden	Blütezeit	Wuchshöhe /-fläche (cm)	Zu beachten	Besondere Liebhaber 
 <small>Rüdiger / CC BY-SA 3.0</small>	Moschus-Malve <i>Malva moschata</i>	mehnjährig	 		Juni – Okt.	20 - 60 / 20 - 30		Malven-Langhornbiene
 <small>H. Zell / CC BY-SA 3.0</small>	Pfirsichblättrige Glockenblume <i>Campanula persicifolia</i>	mehnjährig	 		Mai – Aug.	60 - 80 / 25 - 30		Glockenblumen-Scherenbiene
 <small>Mat. Leidus / CC BY-SA 3.0</small>	Weißer Steinklee <i>Melilotus albus</i>	ein- bis zweijährig	 		April – Sept.	30 - 150 / 30 - 70		
 <small>Konrad Lackerbeck / CC BY 3.0</small>	Wiesen-Pippau <i>Crepis biennis</i>	zweijährig	 		Mai – Juli	30 - 120 / 30 - 50		
 <small>Christian Fischer / CC BY-SA 3.0</small>	Wilde Möhre <i>Daucus carota</i>	zweijährig	 		Juni – Sept.	30 - 80 / 30 - 50		Schwalbenschwanz
 <small>Marinushagenhoher / CC BY-SA 3.0</small>	Wilde Karde <i>Dipsacus fullonum</i>	zweijährig	 	 	Mai – Aug.	25 - 100 / 30 - 40		
 <small>Holger Gasselmann / CC BY-SA 3.0</small>	Ysop <i>Hyssopus officinalis</i>	mehnjährig	 		Juli – Okt.	50 - 80 / 30 - 80		

 **Legende:**

 schattig
 halbschattig
 sonnig





























 nährstoffarm
 nährstoffreich
 kalkhaltig
 lehmig
 sandig
 basisch
 sauer

 ganz oder in Teilen giftig
 nicht berühren



Insektenfreundliche Pflanzen

für einen halbschattigen Standort

	 Name	Lebensdauer	Standort	Boden	Blütezeit	Wuchshöhe /-fläche (cm)	Zu beachten	Besondere Liebhaber 
 <small>Van Leerdus / CC BY-SA 4.0</small>	Acker-Witwenblume <i>Knautia arvensis</i>	mehrwährig			Mai – Sept.	30 - 80 / 30 - 80		Skabiosen-Hosenbiene, Knautien-Sandbiene
 <small>BS Thuner Hof / CC BY-SA 3.0</small>	Blut-Weiderich <i>Lythrum salicaria</i>	mehrwährig			Mai – Sept.	80 - 100 / 30 - 70		Blutweiderich-Langhornbiene
 <small>Robert Hundsdorfer / CC BY-SA 2.0</small>	Christrose <i>Helleborus niger</i>	mehrwährig			Feb. – April	10 - 30 / 30 - 40		
 <small>Superior National Forest / CC BY 2.0</small>	Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i>	mehrwährig			Juni – Aug.	40 - 60 / 30 - 40		
 <small>Dawn Hucsek / CC BY 2.0</small>	Essigrose <i>Rosa gallica</i>	mehrwährig			Juni – Aug.	50 - 100 / 100 - 200		
 <small>Hajthiu / CC BY-SA 3.0</small>	Große Sternmiere <i>Rabera holostea</i>	mehrwährig			April – Juni	15 - 60 / 80 - 100		Hornkraut-Tageulchen
 <small>Archerio / CC BY-SA 3.0</small>	Knoblauchsrauke <i>Alliaria petiolata</i>	mehrwährig			April – Juli	20 - 100 / 40 - 50		Aurorafalter
 <small>Sten-Poise / CC BY-SA 3.0</small>	Rotfrüchtige Zaunrube <i>Bryonia dioica</i>	mehrwährig			Mai – Sept.	200 - 400 / 200 - 400		Zaunrüben-Sandbiene



Legende:




schattig




halbschattig



sonnig




nährstoffarm




nährstoffreich



kalkhaltig



lehmig



sandig



basisch



sauer



ganz oder in Teilen giftig












nicht berühren



Insektenfreundliche Pflanzen

für einen halbschattigen Standort

	 Name	Lebensdauer	Standort	Boden	Blütezeit	Wuchshöhe /-fläche (cm)	Zu beachten	Besondere Liebhaber 
 <small>Pseudonans / CC 0</small>	Weißer Taubnessel <i>Lamium album</i>	mehrwährig			April – Sept.	20 - 50 / 20 - 40		
 <small>Mar. Lehlus / CC BY-SA 4.0</small>	Wiesen-Flockenblume <i>Centaurea jacea</i>	mehrwährig		 	Juni – Okt.	30 - 70 / 30 - 40		Flockenblumen- Langhornbiene



Legende:




schattig




halbschattig



sonnig




nährstoffarm




nährstoffreich



kalkhaltig




lehmig



sandig



basisch



sauer



ganz oder in Teilen giftig




























nicht berühren



Insektenfreundliche Pflanzen

für einen schattigen Standort

	 Name	Lebensdauer	Standort	Boden	Blütezeit	Wuchshöhe /-fläche (cm)	Zu beachten	Besondere Liebhaber 
 <small>Szilgma / CC-BY-SA 4.0</small>	Ausdauerndes Silberblatt <i>Lunaria rediviva</i>	mehnjährig			Mai – Juli	30 - 150 / 15 - 30		
 <small>Jero Opola / CC-BY-SA 4.0</small>	Gemeiner Waldmeister <i>Galium odoratum</i>	mehnjährig			Mai – Juni	20 - 30 / 30 - 50		Rotbinden-Blattspanner
 <small>H. Zell / CC-BY-SA 3.0</small>	Gewöhnlicher Erdrauch <i>Fumaria officinalis</i>	einjährig			April – Nov.	20 - 30 / 40 - 50		
 <small>wirdlissauer/foelky / CC-BY-SA 3.0</small>	Gewöhnliches Maiglöckchen <i>Convallaria majalis</i>	mehnjährig			April – Juni	10 - 30 / 5 - 15	 	
 <small>Dag Lindgren / CC-BY-SA 3.0</small>	Knäuel-Glockenblume <i>Campanula glomerata</i>	mehnjährig			Mai – Aug.	20 - 60 / 10 - 15		Glockenblumen-Felsenbiene, Graue Schuppensandbiene
 <small>Jocan / CC-BY-SA 3.0</small>	Roter Fingerhut <i>Digitalis purpurea</i>	zweijährig			Mai – Juli	40 - 200 / 30 - 50	 	Große Wollbiene, Spargel-Schmalbiene




Legende:




schattig

halbschattig

sonnig




nährstoffarm




nährstoffreich



kalkhaltig



lehmig



sandig



basisch



sauer



ganz oder in Teilen giftig



nicht berühren

